

ด่วนที่สุด

ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๖๒



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น ยะรัง พังยางแดง แม่ลาน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองตะลุมพันธ์

ตามหนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๖๒๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และหนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดดำเนินการสำรวจความประสงค์ในการรับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของเด็กที่มีช่วงอายุระหว่าง ๕ - ๑๑ ปี และจังหวัดปัตตานีได้ประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความรู้และอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีนไฟเซอร์สำหรับกลุ่มเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี นั้น

บัดนี้ จังหวัดปัตตานีได้รับข้อมูลความรู้และอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับกลุ่มเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีน ผลข้างเคียงภายใน ๑ สัปดาห์ อาการที่ควรสังเกต และเอกสารอ้างอิง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีแล้ว ดังนั้น จึงขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัด นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๓๒/๕๘๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี www.pattanilocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐๗๓-๓๔๙๕๑๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๗๓-๓๓๖๕๘๑

ผู้ประสานงาน นางสาวคันสนีย์ แก้วกระบัตร์ โทร.๐๙๑-๘๔๕๗๗๔๒

☐	ส.ว.ท.
☐	อ.ว.บ.ด.
☒	อ.ว.ล.ล.
☐	อ.ว.ก.ม.
☐	ก.ว.ก.ง.



ส.ว.ก.ว.ก.ม.	
รับที่	461
วันที่	20 มี.ค. 2565
เวลา	14.21 น.

ที่ ปน ๐๐๓๒/ ๕๘๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ตำบ.ลุมปะมิแล อำเภอมะนัง
ปน ๙๔๐๐๐

๑๗

มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลความรู้และอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มนักเรียนที่มี
ช่วงอายุระหว่าง ๕ - ๑๑ ปี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/๖๒๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลความรู้และอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
ภายหลังได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มนักเรียนที่มีช่วงอายุระหว่าง ๕ - ๑๑ ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ขอส่งข้อมูลดังกล่าว ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลบุรี รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
โทร. : ๐ ๙๓๔๖ ๐๓๑๐
โทรสาร. : ๐ ๙๓๔๖ ๐๒๓๕
E-mail : fdatani@gmail.com

ข้อมูลความรู้และอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 5 – 11 ปี

ข้อมูลทั่วไป

- วัคซีน Pfizer-BioNTech เป็นวัคซีนชนิด mRNA ได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วในผู้ใหญ่อายุ 16 ปีขึ้นไป ต่อมาได้รับอนุญาตให้ขยายกลุ่มอายุเป็น 12 ปีขึ้นไปเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และขยายลงมาถึง 5 ปีขึ้นไปเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันในสหรัฐฯ มีเด็กอายุ 5-11 ปี ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ประมาณ 6 ล้านคน คิดเป็น ๒.๕% ของผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด
- ขนาดการใช้วัคซีน 10 ไมโครกรัม (ลดลงเหลือ 1 ใน 3 เท่าของขนาดที่ฉีดในวัยรุ่นและผู้ใหญ่)
- ฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อเนื้อจำนวน ๒ เข็ม ห่างกัน ๒๑ วัน (๓ สัปดาห์)
- ประสิทธิภาพ : ป้องกันอาการป่วย ๙๐.๗%

อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีน

ผลข้างเคียง ภายใน 1 สัปดาห์

- ไม่พบผลข้างเคียงร้ายแรง
 - กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กอเมริกันที่ฉีดไป ๗ ล้านคน พบ ๘ คน (ประมาณ 1 ในล้าน) ซึ่งน้อยกว่าในกลุ่มเด็กวัยรุ่นมาก และอาการไม่รุนแรง หายเป็นปกติ
 - ผลข้างเคียงเฉพาะที่ ที่พบบ่อย คือ ปวดบริเวณที่ฉีด ๗๔.๑%*, ๗๑%** บวม ๑๐.๕%*, ๑๕.๓%** แดง ๑๔.๗%*, ๓๑.๕%**
 - ผลข้างเคียงทั่วไป ที่พบบ่อย คือ อ่อนเพลีย ๓๓.๖%*, ๓๙.๔%** ปวดศีรษะ ๒๒.๔%*, ๒๘%** ปวดกล้ามเนื้อ ๙.๑%*, ๑๑.๗%** ไข้ ๒.๕%*, ๖.๕%** นอนหลับ ๔.๖%*, ๙.๘%** คลื่นไส้ ๒.๒%*, ๑.๙%** ท้องเสีย ๕.๙%*, ๕.๓%** ปวดข้อ ๓.๓%*, ๕.๒%**
- หมายเหตุ * หมายถึง เข็มที่ 1 และ ** หมายถึง เข็มที่ 2

อาการที่ควรสังเกต ดังนี้

- แขนหน้าอก เจ็บหน้าอก
- หอบเหนื่อยง่าย
- ใจสั่น
- หมดสติ เป็นลม หรือรู้สึกอ่อนเพลียผิดปกติ
- หากมีอาการเหล่านี้ให้รีบมารับการรักษา เพื่อให้การดูแลรักษาอย่างถูกต้อง เนื่องจากอาการเหล่านี้อาจเกิดจากภาวะอื่นได้ และข้อปฏิบัติภายใน ๗ วันหลังฉีดวัคซีน ไม่แนะนำเรื่องออกกำลังกายหนัก ๆ ทั้งในเด็กและวัยรุ่นหญิงชาย เพราะจะทำให้หัวใจต้องทำงานเพิ่มขึ้น และความรู้สึกเหนื่อยจากออกกำลังกาย อาจทำให้กังวลและไม่แน่ใจว่าเป็นผลจากวัคซีนหรือไม่

เอกสารอ้างอิง

1. Emmanuel BW, Kawsar RT, Charu S, et al. Evaluation of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Children 5 to 11 Years of Age. The New England Journal of Medicine. 2022 Jan; 386:35-46.
2. FDA. Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee. 2021 October: 24-32.