



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โทร. ๐-๗๓๓๔-๙๕๑๙  
ที่ ปน ๐๐๒๓.๑/๖๗๖๐ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕


เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อ กรณีโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โปรดเห็นชอบให้กองการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อ กรณีโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฝีดาษวานร กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ “แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อ กรณีโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)” เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดและครอบครัว รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดเกิดความตระหนัก เพื่อนำไปสู่การป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อฝีดาษวานร รายละเอียดตามแนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อ กรณีโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) ที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบต่อไป

  
(นายอรรถพล คณานุรักษ์)  
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี



# แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อ ทรณโรคฝดษววน (Monkeypox)

## โรคฝดษววน (Monkeypox)




### การรักษผู้ป่วยยืนยันฝดษววน

องคความรู่ถึานการปองกันโรคและยารักษายังมีจำกัด เฒ่นำให้ admit กุกรายในรอรพยบาลเพือลดโอกาสการแพรงกระจายโรคและเพือการติดตามอาการ

1. การรักษาตามอาการ เป็นการรักษแบบประคัประคองตามอาการของผู้ป่วย เช่น ลดไข้ ลดอาการไม่สบายจากตุ่มหนอง และดูแลไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
2. การรักษาจำเพาะ ยาต้านไวรัสรักษาเป็นยาที่ใช้ในการรักษาอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ ทั้งนี้ ยาที่มีรายงานให้รายผู้ป่วยที่อาการรุนแรง คือ tecovirimat (TPOXX)

ข้อมูลเกี่ยวกับยา Tecovirimat: TPOXX C19H15F3N2O3

- เป็นยาที่มีทั้งในรูปรับประทาน และรูปที่ให้หลอดเลือด (oral and I.V.) ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ไวรัสในกลุ่ม orthopoxviruses: variola (smallpox), monkeypox, cowpox, vaccinia complications
- Tecovirimat ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแทรกของไวรัสเข้าไปในเซลล์
- มีรายงานที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศกลุ่มยุโรป



### การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ

ใช้หลักการป้องกันมาตรฐาน (standard precautions) และมาตรการป้องกันตามวิธีการที่แพร่กระจายเชื้อ (transmission-based precautions) วิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโดยการสัมผัส (contact precautions) และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากละอองฝอย (droplet precautions) เป็นหลัก โดย

#### 1. ห้องผู้ป่วย

- 1.1 ให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องแยกเดี่ยว (single isolation room) ประตูปิดสนิท มีห้องน้ำในตัวไม่จำเป็นต้องเป็นห้องที่มีความดันลบ
- 1.2 แยกอุปกรณ์ที่ใช้ในห้อง ให้ใช้เฉพาะราย เช่น ปรงกวัดใช้ หูฟัง โทรศัพท
- 1.3 หลีกเลียงกิจกรรมที่ทำให้มีการฟุ้งกระจายจากสะเก็ดของรอยโรค เช่น การใช้พัดลมส่าย การกวาด ปิดฝุนหรือดูดฝุน เป็นต้น

#### 2. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย

- 2.1 ผู้ป่วย: สวมหน้ากากอนามัยถ้าใกล้ชิดกับบุคคลอื่น และใส่เสื้อผ้าที่ปกคลุมรอยโรค เช่น เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว
- 2.2 บุคลากร: พิจารณาตามกิจกรรม และความเสี่ยงของหัตถการ

#### 3. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

- 3.1 ทำเมื่อจำเป็น และให้แจ้งหน่วยงานปลายทางทราบ
- 3.2 ผู้ป่วย: สวมหน้ากากอนามัย และมีการปกคลุมรอยโรคให้มิดชิด เช่น ใช้ผ้าห่มคลุม หรือสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว
- 3.3 บุคลากร: พิจารณาตามกิจกรรม และความเสี่ยงของหัตถการ

