

# ด่วนที่สุด

ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๐๗๑



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความร่วมมือการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง พ.ศ.๒๕๕๗

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำแนะนำสำหรับประชาชน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี แจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาข้อมูลสถานการณ์และความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโปลิโอที่อาจนำเข้ามาจากภายนอกประเทศ จึงจำเป็นต้องดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอใน พ.ศ.๒๕๕๗ ต่อไป เพื่อป้องกันการระบาดที่อาจเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทย ยังมีเด็กด้อยโอกาสในกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายอพยพ ทั้งที่เป็นเด็กไทยและเด็กต่างด้าวที่เข้าถึงการบริการวัคซีนในระบบปกติได้ยาก อาจจะไม่เคยได้รับวัคซีนหรือยังได้รับไม่ครบถ้วนตามกำหนด อีกทั้งยังมีบางพื้นที่ที่พบเด็กป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งนับเป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อที่อาจแพร่ระบาดเข้ามาได้ โดยกำหนดวันรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี และเด็กต่างด้าวอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ทุกคน ดังนี้ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒ ในวันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี จึงขอความร่วมมือจากท่านในการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ให้มารับวัคซีนโปลิโอในวันรณรงค์ โดยพร้อมเพรียงกัน และขอให้ท่านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพร คณานุรักษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน  
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๗๓๓๔-๙๕๑๙ ต่อ ๑๑๒

โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๖๕๘๑

## โรคโปลิโอ และการป้องกันโรค

### คำแนะนำ สำหรับประชาชน

#### ❖ ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการกวาดล้างโรคโปลิโอแล้ว

โดยพบผู้ป่วยรายสุดท้าย เมื่อ เมษายน ๒๕๔๐ จากการทุ่มเทในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และความร่วมมือของประชาชนในการพาบุตรหลานมารับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค แต่อย่างไรก็ตามประเทศอาจเกิดการระบาดของโรคได้อีก ซึ่งถ้าเกิดการระบาดประเทศไทยจะต้องใช้งบประมาณและบุคลากรจำนวนมากในการกวาดล้างโรคโปลิโอ

#### ❖ โรคโปลิโอยังมีระบาดอยู่ และมีการแพร่ระบาดเข้าไปอีกในหลายประเทศ

ปีนี้ทั่วโลก พบผู้ป่วยจำนวน ๓๓๔ ราย โดยพบในประเทศที่มีโรคโปลิโอเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic countries) คือ ประเทศไนจีเรีย ๕๑ ราย ปากีสถาน ๕๙ ราย และอัฟกานิสถาน ๙ ราย นอกนั้นพบในพื้นที่ภูมิภาคแอฟริกาที่มีการระบาดของโรคโปลิโอจากการนำเข้าเชื้อ importation ได้แก่ ประเทศเอธิโอเปีย ๖ ราย แคเมอรูน ๒ ราย โซมาเลีย ๑๘๐ ราย ซีเรีย ๑๓ ราย และเคนยา ๑๔ ราย สำหรับประเทศไทยยังมีเด็กด้อยโอกาสในกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายอพยพ ทั้งที่เป็นเด็กไทยและเด็กต่างด้าว ที่เข้าถึงการบริการวัคซีนในระบบปกติได้ยาก อาจจะไม่เคยได้รับวัคซีนหรือยังได้รับไม่ครบถ้วนตามกำหนด อีกทั้งหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พบเด็กป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งนับเป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อที่อาจแพร่ระบาดเข้ามาได้

#### ❖ ประเทศไทยต้องรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอทุกปี ทั้งๆ ที่ไม่มีผู้ป่วยโปลิโอแล้ว

การรณรงค์ยังเป็นในประเทศที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ เนื่องจากประเทศใกล้เคียงยังพบมีการระบาดของโรคอยู่ ประกอบกับการเดินทางไปมาระหว่างประเทศเป็นไปได้ง่าย จึงเป็นโอกาสที่อาจมีการนำเชื้อเข้ามาแพร่ให้เด็กไทยได้ อีกทั้งยังมีเด็กต่างด้าวอยู่มากมาย ซึ่งเด็กเหล่านี้หลบซ่อน หรือย้ายที่อยู่บ่อย จึงได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน เมื่อได้รับเชื้อแล้ว จะแพร่กระจายสู่เด็กไทยได้ ดังนั้น กลไกสำคัญของการรณรงค์คือให้วัคซีนพร้อมกันวันเดียวแก่เด็ก เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สูงและกวาดล้างเชื้อโปลิโอให้หมดไปอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาภาวะปลอดโรคไว้ จนกว่าจะล้างโรคโปลิโอให้หมดไปอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาภาวะปลอดโรคไว้ จนกว่าจะกวาดล้างโรคโปลิโอได้หมดทั่วโลก

#### ❖ เราสามารถช่วยป้องกันไม่ให้โรคโปลิโอกลับมาแพร่ระบาดได้อีก โดย

ช่วยกันเฝ้าระวังโรค : ถ้าพบเห็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี มีอาการแขนขาอ่อนแรง ควรแนะนำให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สถานีอนามัย หรือศูนย์บริการสาธารณสุขที่ใกล้บ้าน เพื่อให้มีการตรวจหาเชื้อโปลิโอ และหาสาเหตุต่อไป

ช่วยกันป้องกันโรค : ตรวจสอบดูประวัติรับวัคซีนของบุตรหลานในสมุดบันทึกสุขภาพ ว่าได้รับครบถ้วนตามกำหนดหรือไม่ โดยปกติเด็กทุกคนจะได้รับสมุดบันทึกสุขภาพเมื่อแรกคลอด และใช้เป็นประวัติสุขภาพติดตัวทุกครั้ง ที่โรงพยาบาลเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคตามกำหนด หากไม่มั่นใจว่าบุตรหลานได้รับวัคซีนครบหรือไม่ควรปรึกษาแพทย์ โรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อจะได้นัดหมายมารับวัคซีนให้ครบถ้วนหรือหากเป็นช่วงรณรงค์ประจำปี ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ก็สามารถมาปรึกษาและขอรับวัคซีนได้

#### ลูกหลานจะปลอดภัย ต้องพาไปหยอดวัคซีนโปลิโอ

โรคโปลิโออาจกลับคืนใหม่ได้ หากไม่รวมใจกันป้องกัน รักลูกห่วงหลานต้องพามารับวัคซีนเพิ่มเติม

แม้จะเคยได้รับมาก็ครั้งแล้วก็ตาม ให้พามารับวัคซีนโปลิโอเพิ่มอีก 2 ครั้ง ในวันรณรงค์ฯ

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 และ ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557

โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

- ❖ โคลิโพลิโอ เดิมเรียกว่า โคลิไซซัสหลังอักเสบ เป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส เชื้อจะเข้าไปในระบบประสาท และเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการอัมพาตตามมา เชื้อไวรัสโพลิโอ สามารถก่อให้เกิดโรคได้ในคนทุกกลุ่มอายุ แต่มักจะเกิดโรคในกลุ่มอายุต่ำกว่า ๕ ปีมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอ ส่วนในเด็กโต หรือผู้ใหญ่ มักจะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิต
- ❖ เชื้อไวรัสจะเข้าร่างกายทางปาก โดยกินเชื้อที่ติดไปกับมือ หรืออาหาร ซึ่งเชื้อไวรัสจะผ่านออกมากับอุจจาระของผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ เชื้อไวรัสจะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในหลอดอาหารส่วนบนของลำไส้ ต่อมาจะเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง เมื่อเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้น จะเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้ป่วย จากนั้นเชื้อบางส่วนจะเข้าสู่ระบบประสาท ทำลายเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ถ้าเป็นมากเซลล์ประสาทถูกทำลาย ก็จะเป็นอัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก และจะลีบเล็กลงที่สุดในที่สุด
- ❖ อาการของโรค คือ ผู้ป่วยมักจะมีไข้ อาจมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เจ็บคอ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ บางรายปวดศีรษะมาก มีอาการตึงกล้ามเนื้อที่คอด้านหลัง ตามลำตัวและขา ผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง จะเริ่มด้วยอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ตามด้วยการมีอัมพาตของกล้ามเนื้อที่แขนหรือขา ทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้
- ❖ สร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่เด็กเพื่อป้องกันโรค ด้วยการให้วัคซีนป้องกันโรค เป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุด โดยนำเด็กมารับวัคซีน พร้อมกับวัคซีนชนิดอื่นๆ ตามกำหนดการให้วัคซีนปกติที่โรงพยาบาลนัดไว้ ให้ครบอย่างน้อย ๓ ครั้ง เมื่ออายุครบ ๑ ปี และจะได้รับวัคซีนกระตุ้นอีก ๒ ครั้ง เมื่ออายุ ๑ ปีครึ่ง และ ๔ ปี และให้วัคซีนเสริมอีก ๒ ครั้ง ในช่วงรณรงค์เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม
- ❖ ล้างมือให้สะอาด ป้องกันได้ทุกโรค ให้เด็กล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังขับถ่าย หรือพยายามล้างมือให้เด็กด้วยน้ำสบู่บ่อยๆ ดูแลการขับถ่ายและกำจัดอุจจาระเด็กให้ถูกสุขลักษณะโดยอุจจาระลงส้วมทุกครั้งและรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด จะช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากการได้รับเชื้อที่เข้าทางปากได้
- ❖ การมารับวัคซีนในช่วงที่มีการรณรงค์ฯ จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคให้แก่เด็ก โดยปกติกระทรวงสาธารณสุขจะกำหนดให้มี การรณรงค์เป็นประจำทุกปี ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้เด็กทุกคน มีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้น ทำให้เชื้อโพลิโอ ไม่สามารถอยู่ในร่างกายเด็ก และจะถูกกำจัดออกไป

#### ❖ ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรับวัคซีน

- ⊗ ไม่ให้วัคซีนในเด็กที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล เด็กที่ป่วย หรือมีคนป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน หรือโรคเมะเร็ง
- ⊗ วัคซีนนี้เป็นชนิดกินไม่ต้องฉีดยา ไม่มีไข้ อาการข้างเคียงอื่นๆ พบได้น้อย ถ้าก่อนรับวัคซีนเด็กมีอาการป่วยธรรมดา เช่น เป็นไข้ ไข้หวัด ท้องเสีย ก็รับวัคซีนได้ ส่วนเด็กที่ติดเชื้อ เอชไอวี สามารถให้วัคซีนชนิดกินได้เหมือนเด็กปกติ ไม่ว่าจะมีอาการ ของโรคเอดส์แล้ว หรือไม่ก็ตาม
- ⊗ ได้รับวัคซีนโพลิโอหลายครั้งไม่เป็นอันตราย เด็กบางคนแม้จะได้รับวัคซีนมาหลายครั้ง แต่อาจยังมีระดับภูมิคุ้มกันโรคที่ไม่สูงพอที่จะป้องกันโรคได้ และการได้รับวัคซีนหลายครั้ง ก็ยังไม่มีอันตรายแต่อย่างใด แต่กลับจะช่วยกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันโรคให้สูงขึ้น
- ⊗ ถ้าเด็กอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อโพลิโอ โดยเป็นเด็กเพิ่งคลอด หรือยังไม่ถึงวันที่หมอนัดรับวัคซีนครั้งแรก ก็ควรพาเด็กไปหยอดวัคซีน เพื่อป้องกันเด็กจากการได้รับเชื้อ และเป็นโอกาสดีที่เด็กจะได้รับวัคซีนป้องกันเร็วขึ้น
- ❖ ค่าใช้จ่าย : ฟรี